MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

DIIRECCION GENERAL
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA

SUBDIRECCION GENERAL
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD

SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR ALTA PATOGENICIDAD H5N8 Y H5N5 Y BAJA PATOGENICIDAD H5 EN EUROPA

(13 marzo 2017)

Desde el 28 de octubre y hasta la fecha se han notificado en Europa 1.013 focos de IAAP en aves domésticas, 43 en aves cautivas y 1.361 en aves silvestres. En la gráfica siguiente se muestra la evolución de los focos confirmados semanalmente en la que se aprecia una reducción significativa en aves silvestres:



En el siguiente cuadro se indican los países afectados, el tipo y número de focos totales de IAAP y, entre paréntesis, los focos detectados en la semana del 6 al 13 de marzo de 2017:

www.mapama.es
sganimal@mapama.es

C/ Almagro 33
28071 MADRID
TEL: 913478295
FAX: 913478299

País	Focos aves silvestres	Focos aves de corral	Focos aves cautivas
Alemania	615	72 (6)	15
Francia	48	450 (28)	2
Italia	5	9	0
Holanda	45	9	6
Bélgica	2	0	1
Reino Unido	22	10	0
Irlanda	10	0	0
Dinamarca	43	1	1
Grecia	9	5	0
España	2	10	0
Portugal	1	0	0
Austria	47	2	1 (1)
Finlandia	13	0	1
Suecia	23	3	2
República Checa	33	37 (1)	1
Hungría	59	234	5
Polonia	68 (1)	64 (4)	0
Eslovenia	40	0	0
Bulgaria	13	67	2
Lituania	3 (1)	0	0
Rumanía	82 (5)	16 (1)	2
Eslovaquia	57 (1)	8 (1)	2
Croacia	12	7	0
Macedonia	1	1	0
Serbia	20	4	0
Suiza	87	0	0
Bosnia y Herzegovina	0	1	1
Ucrania	1	3	1
Total	1.361 (8)	1.013 (41)	43 (1)

** Entre paréntesis el número de focos de IAAP confirmados durante la última semana.*

Distribución de focos por países en Europa (octubre 2016 – marzo 2017)



	ALE	FRA	HUN	POL	RUM	SUI	BUL	CHE	ESLOVA	HOL	AUS	DIN	ESLOVE	REI	SUE	SER	CRO	FIN	GRE	ITA	ESP	IRL	UCR	BÉL	LIT	BOS	MAC	POR
Nº focos aves cautivas	15	2	5	0	2	0	2	1	2	6	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Nº focos aves silvestres	615	48	59	68	82	87	13	33	57	45	47	43	40	22	23	20	12	13	9	5	2	10	1	2	3	0	1	1
Nº focos aves domésticas	72	450	234	64	16	0	67	37	8	9	2	1	0	10	3	4	7	0	5	9	10	0	3	0	0	1	1	0

Durante esta semana han sido confirmados tres focos de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) en Francia. En total, desde el 27 de octubre y hasta la fecha se han notificado 53 focos en aves domésticas y 3 en aves cautivas en Europa.

En las Imágenes 1-3 se muestran todos los focos hasta el 13 de marzo de 2017 según subtipo.

Imagen 1. Focos IAAP H5N8



Imagen 2. Focos IAAP H5N5



Imagen 3. Focos IABP



En la imagen 4 se muestran los focos confirmados la última semana, del 6 al 13 de marzo de 2017.

Imagen 4. Focos notificados la última semana



Ante la detección de los focos en aves domésticas fueron aplicadas las medidas previstas en la Directiva 2005/94/EC, entre ellas el sacrificio de todas las aves de la explotación y el establecimiento de las respectivas zonas de protección y de vigilancia con restricción de movimiento de aves y de sus productos. La detección del subtipo H5N8 del virus de la IA en aves silvestres no implica adoptar medidas de restricción de movimientos de aves y de sus productos.

Desde el MAPAMA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Puede encontrarse más información sobre la bioseguridad en avicultura en la página Web del MAPAMA
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/bioseguridad-buenas-practicas/aves_bioseguridad.aspx